

【共用题干（13~14题）】

男，46岁，因足底刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。

13. 易导致病人死亡的常见原因是（ ）。
- 休克
 - 窒息
 - 肺部感染
 - 心脏损伤
 - 脱水，酸中毒
14. 下列护理措施中，与控制痉挛无关的是（ ）。
- 保持病室安静
 - 护理措施要集中进行
 - 按时使用镇静剂
 - 鼻饲流质饮食
 - 避免强光照射

【共用题干（15~17题）】

男性，8岁，额部多发性疖。未治红肿，扩大，弛张性高热，4天后臀部皮下又发现一肿块，疼痛，压痛明显，且有波动感。

15. 进一步确诊的方法是（ ）。
- 头部X线摄片
 - 臀部肿块B超检查
 - 臀部X线摄片
 - 查血象
 - 脓毒血症
16. 诊断应考虑（ ）。
- 菌血症
 - 败血症
 - 毒血症
 - 寒性脓肿
 - 脓毒血症
17. 治疗方案为（ ）。
- 醇浴退热
 - 额部换药
 - 臀部脓肿切开引流及抗生素治疗
 - 加强营养，增强抵抗力
 - 综合应用多种抗生素

【共用题干（18~20题）】

女性，30岁，背部肿块，红、肿、疼痛3天，寒战、发热39℃，查体：背部肿物3cm×5cm，触之有波动感

18. 当病灶做局部引流和全身应用抗生素后，仍有寒战、高热，最合适的治疗措施是（ ）。
- 联合应用抗生素，并加大剂量
 - 尽快明确细菌种类和药敏试验
 - 寻找有无其他感染病灶
 - 使用抗霉菌药物治疗
 - 加用肾上腺皮质激素
19. 为了提高病人血培养的阳性率，最好的抽血时间是（ ）。
- 发热开始时
 - 寒战开始时
 - 发热最高峰时
 - 寒战结束时
 - 预计寒战发热时
20. 根据临床表现，该患者有脓血症，其主要特点是（ ）。
- 寒战后，高热呈稽留热
 - 白细胞计数 $30 \times 10^9/L$
 - 休克出现早
 - 肝、肾功能损害
 - 转移性脓肿

【共用题干（21~24题）】

男，8岁。足部刺伤1小时，已接受计划性混合疫苗注射。

21. 为预防破伤风发生，最重要的正确的处理是（ ）。
- 刺伤部切开不予缝合
 - 注射TAT 750U
 - 注射TAT 1500U
 - 注射TAT 3000U
 - 注射破伤风类毒素0.5ml
22. 破伤风注射TAT的目的是（ ）。
- 杀死破伤风杆菌
 - 中和与神经结合的毒素
 - 中和游离的毒素

- D. 清除毒素来源
 - E. 抑制破伤风杆菌生长
23. 破伤风病人采用人工冬眠，主要目的是（ ）。
- A. 控制炎症扩散
 - B. 减少抽搐
 - C. 便于护理
 - D. 降低体温
 - E. 防止合并症发生
24. 为预防破伤风，清创时伤口使用（ ）冲洗最好。
- A. 0.1%苯扎溴铵（新洁尔灭）液
 - B. 0.9%氯化钠
 - C. 蒸馏水
 - D. 0.05%呋喃西林液
 - E. 3%双氧水

【共用题干（25~26题）】

病例：男性病人，40岁。4天前不慎刺伤左中指末节指腹，当时有少量出血。昨日见局部肿胀明显，皮肤苍白，有搏动性跳痛，特别是夜间疼痛难忍，全身不适。

25. 该病人目前的情况是（ ）。

- A. 甲沟炎
 - B. 甲下脓肿
 - C. 脓性指头炎
 - D. 急性化脓性腱鞘炎
 - E. 化脓性滑囊炎
26. 该病人如果不及时治疗，易发生（ ）。
- A. 末节指骨坏死
 - B. 掌中间隙感染
 - C. 慢性甲沟炎
 - D. 挠侧化脓性滑囊炎
 - E. 鱼际间隙感染

B型题

- A. 面部疖肿
 - B. 下肢丹毒
 - C. 急性蜂窝织炎
 - D. 浅部脓肿
 - E. 背痛
1. 感染性肿物有波动感的是（ ）。
2. 一般不化脓的疾病是（ ）。

第八章 损伤

A1 题型

1. 易发生挤压综合征的挤压部位是 ()。
 - A. 头部
 - B. 胸部
 - C. 手掌和前臂
 - D. 大腿和臀部
 - E. 足和小腿
2. 属于闭合性损伤的是 ()。
 - A. 裂伤
 - B. 爆震伤
 - C. 火器伤
 - D. 剥脱伤
 - E. 擦伤
3. 下列不是开放性损伤的是 ()。
 - A. 擦伤
 - B. 挫伤
 - C. 刺伤
 - D. 割伤
 - E. 火器伤
4. () 是闭合性损伤。
 - A. 擦伤
 - B. 刺伤
 - C. 挫伤
 - D. 切割伤
 - E. 裂伤
5. 开放性损伤后预防破伤风的有效措施是 ()。
 - A. 清创并注射青霉素
 - B. 清创并注射破伤风抗毒素
 - C. 注射破伤风类毒素
 - D. 清创并注射破伤风类毒素
 - E. 注射人体破伤风球蛋白
6. () 损伤已过 12 小时, 清创后仍可一期缝合。
 - A. 上肢
 - B. 下肢
 - C. 面部
 - D. 背部
 - E. 足部
7. 清洁伤口是指 ()。
 - A. 清创后的伤口
 - B. 伤后 6~8h 内的伤口
 - C. 无菌手术的伤口
 - D. 消炎后伤口
 - E. 引流后伤口
8. 清创术最好在伤后 () 进行。
 - A. 6~8h 内
 - B. 8~10h 内
 - C. 10~12h 内
 - D. 12~14h 内
 - E. 24h 内
9. 伤口污染轻, 清创术可延长时限至 ()。
 - A. 12h 内
 - B. 16h 内
 - C. 20h 内
 - D. 24h 内
 - E. 28h 内
10. 头皮血运丰富, 抗感染与生长力较强。清创术可延长至 ()。
 - A. 3~5 小时
 - B. 8 小时
 - C. 12 小时
 - D. 24 小时
 - E. 72 小时
11. 损伤的处理不正确的是 ()。

- A. 火器伤应尽早施行清创术，争取一期缝合
B. 刺伤易并发厌氧菌感染，宜用3%过氧化氢换药
C. 爆震伤可造成病人内脏损伤，应做全面检查
D. 扭伤病人早期不可按摩伤处
E. 挤压伤的病人需观察其尿量
12. 伤后超过12 h，在清创后仍缝合的伤口不包括（ ）。
A. 颜面部
B. 关节
C. 大血管，神经暴露的伤口
D. 肌肉暴露
E. 肌腱暴露
13. 宜用5%氯化钠溶液做湿敷的创面是（ ）。
A. 浅平、干净创面
B. 肉芽组织水肿创面
C. 脓液分泌物较多的创面
D. 绿脓杆菌感染的创面
E. 慢性顽固性溃疡创面
14. 应首先换药的伤口是（ ）。
A. 胃手术伤口
B. 切割伤伤口
C. 疝手术伤口
D. 急性阑尾炎伤口
E. 肠痿伤口
15. 肉芽组织表面光滑晶亮，呈淡红色，触及不出血，换药时创面应用（ ）。
A. 3%~5% 氯化钠湿敷
B. 凡士林纱布覆盖
C. 抗生素溶液湿敷
D. 局部紫外线照射
E. 3%过氧化氢溶液湿敷
16. 用于肉芽水肿创面湿敷的药液为（ ）。
A. 硼酸溶液
B. 生理盐水
C. 3%~5%氯化钠
D. 凡士林纱布
E. 3%过氧化氢
17. 外敷疖肿用（ ）。
A. 0.02%呋喃西林溶液
B. 0.1%雷佛奴尔溶液
C. 氧化锌软膏
D. 10%鱼石脂软膏
E. 0.75%碘伏
18. 适用于肉芽水肿创面湿敷的溶液是（ ）。
A. 优锁
B. 0.02%~0.05%氯己定
C. 3%~5%氯化钠
D. 碘伏
E. 0.02%~0.01%高锰酸钾
19. 头皮裂伤。经清创后，应采用的方法是（ ）。
A. 蛇形
B. 螺旋形
C. 螺旋反折形
D. 8字形
E. 回反形
20. 常用的换药溶液有（ ）。
A. 来苏液
B. 3%双氧水
C. 生理盐水
D. 0.1%洗必泰液
E. 高锰酸钾溶液
21. 外科换药的目的不包括（ ）。
A. 利于伤口愈合
B. 保持引流通畅
C. 清除坏死组织
D. 清除伤口分泌物
E. 抑制肉芽组织生长
22. 换药室的管理制度不包括（ ）。
A. 专人管理
B. 严格执行清洁、消毒和无菌操作制度

- C. 保证物品供应齐全
D. 换药工作集中固定在一定时间内
E. 特异性感染伤口换药集中在每日下午, 在换药室进行
23. 下述缝合伤口拆线时间不正确的有()。
- A. 头面颌部手术 4~5 天
B. 四肢手术 10~12 天
C. 腹部 7~8 天
D. 减张缝合一般 7 天
E. 年老体弱营养差的适当推迟
24. 创面肉芽组织鲜红, 硬实, 分泌物不多, 触之易出血, 换药时应用()。
- A. 5%氯化钠溶液湿敷
B. 0.1%雷佛奴尔液湿敷
C. 凡士林油纱布覆盖
D. 红外线局部照射
E. 2%硝酸银烧灼
25. 换药操作错误的是()。
- A. 用手揭去外层敷料和内层敷料
B. 用酒精棉球消毒伤口周围皮肤两次
C. 用盐水棉球轻轻拭去伤口内脓液或分泌物
D. 敷贴药物纱布
E. 盖上灭菌干纱布, 固定
26. 下列浅平肉芽创面需用手术剪将其剪平, 以利创缘新生上皮生长的是()。
- A. 健康肉芽组织
B. 肉芽生长过度
C. 肉芽水肿
D. 慢性溃疡面肉芽
E. 脓腔伤口肉芽
27. 应先换药的伤口是()。
- A. 破伤风伤口
B. 脓肿切开引流的伤口
C. 乳腺手术切口拆线
D. 压疮创面
E. 肾盂切开取石术后拔除引流物
28. 伤口用药错误的是()。
- A. 0.02%~0.05%呋喃西林溶液
B. 0.1%雷夫奴尔溶液
C. 1:2000~1:5000 高锰酸钾溶液
D. 生理盐水或高渗盐水
E. 70%酒精
29. 置放橡皮片引流的一期缝合伤口, 拔除引流条的时间是()。
- A. 12~24 小时
B. 24~48 小时
C. 72 小时
D. 96 小时
E. 1 周
30. 清创时为预防厌氧菌感染, 其冲洗液是()。
- A. 0.02%呋喃西林
B. 优琐
C. 3%过氧化氢
D. 0.05%新洁尔灭
E. 3%生理盐水
31. 深部脓腔伤口宜用的引流物是()。
- A. 橡胶片
B. 纱布条
C. 凡士林布条
D. 橡皮管
E. 烟卷引流管
32. 清洁伤口是指()。
- A. 清创后的伤口
B. 伤后 6~8h 内的伤口
C. 无菌手术的伤口
D. 消炎后伤口
E. 引流后伤口
33. III度烧伤, 下列错误的是()。
- A. 痛觉丧失
B. 无水泡
C. 有网状栓塞血管
D. 焦痂约 3 周后开始分离
E. 留有疤痕

34. 严重烧伤的第一位死因是 ()。
- 休克
 - 急性呼吸衰竭
 - 急性肾功能衰竭
 - 败血症
 - 水、电解质、酸碱平衡紊乱
35. 大面积烧伤病人的护理诊断“体液不足”，其最主要的相关因素是 ()。
- 创面脓毒症
 - 创面渗出
 - 疼痛
 - 饮水不足
 - 高热
36. 判断烧伤输液是否充足的指标以下错误的是 ()。
- 脉搏 < 120 次/分钟
 - 收缩压 $> 60\text{mmHg}$
 - 尿量 $> 30\text{ml/h}$
 - 中心静脉压高于正常
 - 安静，肢体温暖
37. 控制烧伤感染的关键措施是 ()。
- 及时、足量使用有效抗生素
 - 正确处理创面
 - 及时补充有效循环血量
 - 密切观察病情变化
 - 维持室内适当的温度和湿度
38. 深度烧伤晶体液和胶体液的比例为 ()。
- 0.5:1
 - 1:1
 - 1.5:1
 - 2:1
 - 3:1
39. () 不是电击伤创面的特点。
- 局部有灼伤
 - 电流入口处伤势重
 - 电流出口处伤势轻
 - 组织焦化、碳化面明显
 - 皮肤创面小，皮下损伤大
40. 大面积烧伤急救，患者口渴应给予 ()。
- 热开水
 - 糖开水
 - 淡盐水
 - 纯净水
 - 凉茶水
41. 开水烫伤胸腹部，局部水疱形成，伴剧烈疼痛，其烧伤深度为 ()。
- I 度
 - 浅 II 度
 - 深 II 度
 - II ~ III 度的移行深度
 - III 度
42. 大面积烧伤病人的急救，错误的是 ()。
- 去除致伤因素，迅速灭火，离开热源
 - 保护创面，防止污染
 - 预防休克，应用止痛药物
 - 预防休克，大量饮水
 - 保持呼吸道通畅，必要时气管切开
43. 关于烧伤休克期的叙述，下列错误的是 ()。
- 烧伤早期可出现短暂的神经性休克
 - 继而很快出现低血容量性休克
 - 伤后创面渗出 8h 内最快，48h 达高峰
 - 伤后 72h 创面液体开始吸收
 - 大量体液丢失可造成低钾血症或高渗性脱水
44. 烧伤后休克期的主要原因是 ()。
- 精神刺激
 - 创面剧烈疼痛
 - 大量水分蒸发
 - 大量血浆自创面外渗和渗向组织间隙

- E. 大量组织坏死分解产物吸收
45. 烧伤休克期是指伤后 ()。
- 8h 以内
 - 8~12h
 - 12~24h
 - 24~48h
 - 48~72h
46. 护理一成年烧伤病人, 在输液观察中, 说明有效循环血量尚未恢复的指标是 ()。
- 脉搏 110 次/分
 - 尿量 40ml/h
 - 收缩压 90mmHg (12kPa) 以上
 - 中心静脉压 5cmH₂O
 - 肢端温暖, 毛细血管充盈良好
47. 头面部严重烧伤病人的护理, 错误的是 ()。
- 应取平卧位
 - 及时清除眼、外耳道、鼻腔分泌物
 - 用眼药水或眼膏保护角膜, 防止感染
 - 保持耳廓干燥
 - 鼻粘膜涂石蜡油防止干燥
48. 烧伤病人第二个 24 小时输液量, 应为第一个 24 小时输液量的 ()。
- 总量相同
 - 总量的 1/2
 - 总量的 2/3
 - 胶、晶体液的各 1/2 量, 加生理需要量不变
 - 胶、晶体液量不变, 加生理需要量的各 1/2
49. 根据我国情况, 成人头面颈部占人体体表总面积的 ()。
- 9%
 - 10%
 - 15%
 - 5%
 - 3%
50. 大面积烧伤后休克期液体渗出最快是伤后 ()。
- 6~8h
 - 8~24h
 - 24~36h
 - 36~48h
 - 48~72h
51. 头面颈部及会阴部严重烧伤的病入的创伤处理应采用 ()。
- 包扎疗法
 - 暴露疗法
 - 药物湿敷疗法
 - 浸泡疗法
 - 以上都对
52. 防治烧伤休克的重点是 ()。
- 镇静止痛
 - 快速补液
 - 保护创面
 - 保持呼吸道通畅
 - 注意保暖
53. 烧伤患者补液时, 胶体液应首选 ()。
- 全血
 - 右旋糖酐
 - 血浆
 - 706 代血浆
 - 白蛋白
54. 大面积烧伤病人休克期持续时间为 ()。
- 12 小时
 - 24 小时
 - 36 小时
 - 48 小时
 - 72 小时
55. 判断烧伤创面深度的主要依据是 ()。
- 创面的肿胀程度
 - 创面有无水泡

- C. 创面疼痛情况
D. 创面渗出情况
E. 创面残存上皮的有无和多少
56. 大面积烧伤早期发生的休克, 多为 ()。
A. 神经源性休克
B. 心源性休克
C. 低血容量性休克
D. 过敏性休克
E. 感染性休克
57. 大面积烧伤病人抗休克治疗常用的是 ()。
A. 平衡盐溶液
B. 碳酸氢钠等渗盐水
C. 中分子右旋糖酐
D. 低分子右旋糖酐
E. 血浆
58. 烧伤后休克期通常持续的时间为 ()。
A. 24 小时
B. 36 小时
C. 48 小时
D. 60 小时
E. 70 小时
59. 浅Ⅱ度烧伤的特点, 不包括 ()。
A. 剧痛
B. 薄壁大水疱
C. 基底潮湿, 均匀发红
D. 深达真皮表层
E. 愈合后遗留瘢痕
60. 头面部烧伤急救时应特别注意 ()。
A. 保持呼吸道通畅
B. 包敷创面, 避免污染
C. 预防休克
D. 及时清创
E. 早用 TAT, 预防破伤风
61. 烧伤创面疗法, 在下列情况中应该立即改为暴露疗法的是 ()。
A. 敷料湿透
B. 患者发热
C. 创面疼痛
D. 敷料渗液呈绿色
E. 血常规检查中白细胞增高
62. 大面积烧伤患者 24 小时内主要的护理措施是 ()。
A. 镇静、止痛
B. 自理护理
C. 预防感染
D. 保证呼吸道畅通
E. 保证液体输入
63. 浅Ⅱ度烧伤的深度是 ()。
A. 深至皮肤角质层
B. 达真皮深层
C. 深至皮肤生发层
D. 达真皮浅层, 部分生发层健在
E. 深至皮肤全层
64. 浅Ⅱ度烧伤水泡表皮脱落, 基底颜色是 ()。
A. 基底潮湿, 均匀发红
B. 基底湿润苍白
C. 基底暗红
D. 基底黑色
E. 以上都不是
65. 小面积四肢烧伤, 为减轻疼痛和热力的损害, 其处理应 ()。
A. 创面清除异物
B. 清洁或无菌敷料覆盖
C. 将肢体浸入冷水中
D. 给予止痛药物
E. 口服淡盐水
66. 出血部位必须阻断血流时应每压迫 1 小时后要放松 ()。
A. 1~2min
B. 3~4min
C. 5~6min
D. 7~8min
E. 9~10min

67. 下列方法中易引起急性肾功能不全的是 ()。

- A. 指压法
- B. 压迫包扎法
- C. 加垫屈肢法
- D. 止血带法
- E. 直接止血法

68. 遇见下列情况, 首先应抢救 ()。

- A. 休克
- B. 昏迷
- C. 脾破裂
- D. 开放性气胸
- E. 开放性骨折

69. 损伤病人的现场急救措施, 以下不正确的是 ()。

- A. 发现窒息立即口对口呼吸
- B. 做简要的全身检查
- C. 发现活动性出血立即加压包扎
- D. 严密观察生命体征
- E. 发现可疑骨折暂行固定

70. 下列绷带适合于下颌、枕、额部包扎的是 ()。

- A. 丁字带
- B. 四头带
- C. 三角巾
- D. 卷轴带
- E. 胸带

71. 某伤员同时存在下列伤情, 应该首先处理的是 ()。

- A. 右胫骨开放性骨折
- B. 头皮血肿
- C. 右肩关节脱位
- D. 张力性气胸
- E. 右前臂皮肤擦伤

72. 以下卷轴带包扎法中适用于肩、肘、膝、踝关节包扎的是 ()。

- A. 蛇形
- B. 螺旋形
- C. 8 字形

D. 螺旋反折形

E. 回返形

73. 适用于卷轴带开始及终了的包扎方法是 ()。

- A. 蛇形
- B. 螺旋形
- C. 8 字形
- D. 环形
- E. 螺旋反折形

74. 绷带固定不正确的护理是 ()。

- A. 观察肢端血循环
- B. 躯干石膏若影响呼吸应及时处理
- C. 协助病员更换体位
- D. 病员诉石膏型内疼痛给予止痛剂即可
- E. 抬高患肢

75. 夏天, 使用止血带止血应间隔放松止血带 1~2min, 其间隔时间是 ()。

- A. 0.5h
- B. 1h
- C. 2h
- D. 2.5h
- E. 3h

76. 应首先急救的损伤是 ()。

- A. 包膜下脾破裂
- B. 开放性气胸
- C. 脑震荡
- D. 下肢开放性骨折
- E. 单根双处肋骨骨折

77. 按急救顺序对机械性损伤病人最先采取的措施是 ()。

- A. 包扎伤口
- B. 重点检查
- C. 固定和搬运
- D. 抢救生命
- E. 输血、止血

78. 在绷带包扎法中, 肢体卷轴带包扎法的正确操作步骤是 ()。

- A. 从远心端开始包扎
B. 保持肢体在伸展位置
C. 避免肢端外露
D. 每周包扎应压住前周 1/4
E. 上臂用螺旋反折形包扎法
79. 抢救伤员时应当首先处理 ()。
A. 骨折
B. 窒息
C. 出血
D. 疼痛
E. 昏迷
80. 采用绷带包扎法时错误的是 ()。
A. 取舒适坐位或卧位
B. 肢体关节保持功能位置
C. 有伤口者, 应先予清洁并保持干燥
D. 包扎方向是由近心端向远心端
E. 绷带结打在肢体外侧
81. 毒蛇咬伤现场急救首先应 ()。
A. 双氧水冲洗伤口
B. 伤口上方绑扎
C. 刀尖挑开牙痕排毒
D. 普鲁卡因局部封闭
E. 服用蛇药
82. 卷轴带用于径围不一致的小腿和前臂的包扎法是 ()。
A. 环形
B. 螺旋形
C. 螺旋反折形
D. 8 字形
E. 回反形
83. 护理严重挤压伤, 特别注意观察 ()。
A. 神志
B. 局部肿胀
C. 局部温度
D. 体温
E. 尿量、尿色
84. 软组织闭合性损伤早期护理不妥的是 ()。
A. 局部热敷
B. 抬高患肢
C. 局部制动
D. 伤处关节可包扎固定
E. 血肿较大时穿刺抽吸并加压包扎
85. 车祸现场, 应先抢救的伤员是 ()。
A. 脑挫伤
B. 张力性气胸
C. 小腿挫裂伤
D. 肠穿孔
E. 上肢开放性骨折
86. 创伤后最常见的并发症是 ()。
A. 感染
B. 休克
C. 多系统器官衰竭
D. 应激性溃疡
E. 压疮
87. 引起冷伤的主要原因是 ()。
A. 低温
B. 潮湿
C. 营养不良
D. 失血
E. 长时间静止不动
88. 有关 II 度冻伤的叙述, 不正确的是 ()。
A. 损伤在表皮层
B. 水疱形成
C. 疼痛
D. 局部红肿
E. 愈合后可瘢痕
89. 冻僵病人复温的最好措施是 ()。
A. 迅速移至暖室
B. 大量饮热茶
C. 置于 40℃ 温水中浸泡
D. 肌肉注射兴奋剂
E. 快速输血
90. 毒蛇咬伤病人的急救护理, 正确的

是 ()。

- A. 患肢抬高
- B. 患肢宜低垂
- C. 患肢宜平置
- D. 患肢多活动
- E. 患肢多按摩

A2 题型

1. 刘先生, 18 岁, 头部被菜刀砍伤 2 天, 伤后 6cm 裂开, 脓性分泌物较多, 处理方法是 ()。

- A. 清创并缝合
- B. 清创处理伤口不缝合
- C. 控制感染, 定期更换敷料
- D. 清创、缝合并放置引流
- E. 清创, 湿敷包扎

2. 刘女士, 左小腿有 10cm×5cm 的肉芽组织水肿伤面, 换药时, 选用的湿敷药液是 ()。

- A. 等渗盐水
- B. 0.02% 呋喃西林
- C. 0.1% 雷佛奴尔
- D. 优锁溶液
- E. 5%~10% 盐水

3. 男性, 头顶部伤口, 换药后宜用的包扎方法是 ()。

- A. 四头带
- B. 丁字带
- C. 腹带
- D. 胸带
- E. 回反形绷带

4. 手指外伤后感染, 换药前需浸泡伤口, 适宜的溶液是 ()。

- A. 0.01% 新洁尔灭
- B. 0.01% 高锰酸钾
- C. 3% 硼酸溶液
- D. 生理盐水
- E. 3% 盐水

5. 某患者, 成年, 有颈部、左上肢、右

下肢、双臀部烧伤, 计算烧伤面积为 ()。

- A. 42.5%
- B. 35%
- C. 40%
- D. 37.5%
- E. 38%

6. 某烧伤病人出现剧痛, 创面有水疱, 水疱大而饱满, 基底部均匀一致潮红, 是 () 烧伤。

- A. 浅 I 度
- B. 深 II 度
- C. 浅 II 度
- D. III 度
- E. II 度 和 III 度

7. 5 岁小儿头面颈部烧伤, 估计烧伤面积为 ()。

- A. 13%
- B. 16%
- C. 18%
- D. 20%
- E. 22%

8. 4 岁小儿, 头、面、颈及两上臂烧伤, 烧伤面积为 ()。

- A. 13%
- B. 16%
- C. 18%
- D. 22%
- E. 24%

9. 某患者, 成年, 胸、腹、会阴和大腿前侧烧伤时, 其烧伤面积为 ()。

- A. 25.5%
- B. 27%
- C. 30%
- D. 32%
- E. 35%

10. 男性, 20 岁头、面部及右上肢烧伤, 局部大水疱, 疱壁薄, 剧痛, 其烧伤面积和深度为 ()。

- A. 9%, 浅 II 度

- B. 10%, 深Ⅱ度
C. 12%, Ⅲ度
D. 15%, 浅Ⅱ度
E. 20%, 深Ⅱ度
11. 男性, 60岁, 大面积烧伤后2周, 出现寒战, 高热脉率120次/分, 血压112/82mmHg, 烦躁不安, 白细胞计数 $25 \times 10^9/L$, 血培养阳性, 目前病人可能合并()。
- A. 菌血症
B. 脓血症
C. 败血症
D. 毒血症
E. 感染性休克
12. 8岁男孩, 开水烫伤, 双下肢有水疱, 剧痛, 胸腹部为红斑。估计该患儿Ⅱ度烫伤面积是()。
- A. 20%
B. 41%
C. 42%
D. 46%
E. 59%
13. 蓝女士, 30岁, 体重50kg, 烧伤面积80%, 第一个24小时应补液体总量是()。
- A. 3000ml
B. 4000ml
C. 5000ml
D. 6000ml
E. 8000ml
14. 史先生, 29岁, 颜面、胸、腹部、两前臂、双手、两小腿、双足部及背部散在约三手掌面积Ⅱ度、Ⅲ度烧伤, 烧伤面积是()。
- A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
E. 50%
15. 一烧伤病人, 体重50kg, 其烧伤面积Ⅰ度10%、Ⅱ度30%, Ⅲ度10%, 输液时除生理需要量外, 第一个24h应补胶、晶体液约()。
- A. 2500ml
B. 3000ml
C. 3500ml
D. 4000ml
E. 4500ml
16. 9岁小孩双上肢烧伤, 其烧伤面积为()。
- A. 15%
B. 18%
C. 12%
D. 10%
E. 20%
17. 女, 30岁, 不慎被开水烫伤左上肢, 患者诉伤口疼痛, 烧伤部位水泡破裂后, 基底潮湿, 均匀发红, 其烧伤深度是()。
- A. Ⅰ度
B. 浅Ⅱ度
C. 深Ⅱ度
D. Ⅲ度
E. 混合深Ⅱ度和Ⅳ度
18. 男性, 20岁, 体重60kg, 双上肢及躯干深Ⅱ度烧伤。该病人第1个24小时需要补液的总量约为()。
- A. 4000ml
B. 5000ml
C. 6000ml
D. 7000ml
E. 8000ml
19. 男, 20岁, 头颈及胸腹部烧伤。其烧伤面积是()。
- A. 18%
B. 22%
C. 25%
D. 30%
E. 35%

20. 男, 28 岁。被沸水烫伤, 右手掌焦痂呈皮革样, 不痛, 面部红斑, 表面干燥, 左上肢、颈部、胸腹部、双足和双小腿均为水疱, 有剧痛, 并发生低血容量性休克。估计该病人Ⅱ度烧伤面积为 ()。

- A. 54%
- B. 49%
- C. 58%
- D. 45%
- E. 39%

21. 男性, 46 岁, 体重 60kg, Ⅱ度烧伤面积 50%, 医嘱大量补液, 第一天补液总量应为 ()。

- A. 4500ml
- B. 5400ml
- C. 6000ml
- D. 6500ml
- E. 8000ml

22. 男性, 20 岁。左足被开水烫伤, 疼痛剧烈, 局部有水疱, 其烧伤面积及深度为 ()。

- A. 3%, I 度
- B. 3.5%, I 度
- C. 3.5%, 浅Ⅱ度
- D. 7%, 浅Ⅱ度
- E. 4%, 深Ⅱ度

23. 病人, 女性, 55 岁, 干石灰烧伤双下肢, 其急救处理应是 ()。

- A. 直接用水冲洗
- B. 除去石灰粉粒后用水冲洗
- C. 将双下肢浸泡在水中
- D. 以湿布覆盖创面送往医院
- E. 用 2%~5%碳酸氢钠溶液湿敷

24. 罗先生, 25 岁, 车祸造成多发性损伤, 急救时首先处理的情况是 ()。

- A. 窒息
- B. 腹部损伤
- C. 股骨干开放性骨折
- D. 休克

E. 胸部损伤

25. 病人, 男性, 30 岁, 左小腿刀割伤 6h, 伤口约 5cm, 伤口正确的处理是 ()。

- A. 立即用消毒敷料包扎
- B. 局部应用抗菌药和止血剂
- C. 伤口表面放消炎粉
- D. 伤口彻底清创缝合后包扎
- E. 立即用胶布粘合伤口

26. 男性病人, 19 岁。头部被玻璃瓶刺伤 2 天。见 6cm 长裂口, 脓性分泌物较多, 处理的方法是 ()。

- A. 清创后不予缝合
- B. 清创并缝合
- C. 换药控制感染
- D. 清创后湿敷包扎
- E. 清创缝合并放置引流

A3 题型

【共用题干 (1~3 题)】

某女性病人, 因烧伤引起神志淡漠、面色苍白、皮肤湿冷, P 110 次/分, R 40 次/分, BP 60/40mmHg, 尿量 10ml/h, 化验 CO_2CP 18mmol/L。

1. 该病人护理评估为 ()。

- A. 过敏性休克
- B. 低血容量性休克
- C. 感染性休克
- D. 心源性休克
- E. 神经性休克

2. 该病人的护理诊断不包括 ()。

- A. 体液不足
- B. 皮肤完整性受损
- C. 有感染的危险
- D. 心衰
- E. 气体交换障碍

3. 该病人的护理措施不包括 ()。

- A. 止痛
- B. 应用肝素
- C. 扩容

- D. 纠正酸中毒
- E. 使用血管活性药物

【共用题干（4~6 题）】

男性，40 岁，体重 70kg，被热液烫伤 3 小时来诊。查体：烫伤包括头、面、颈部、右上肢、右下肢（不包括臀部）、左膝关节以下至足趾及胸部一手掌大小的面积，创面大水疱，潮红，水肿，剧烈疼痛。

4. 该病人烧伤的面积和深度为（ ）。
 - A. 35%，浅Ⅱ度
 - B. 40%，深Ⅱ度
 - C. 45%，Ⅲ度
 - D. 50%，浅Ⅱ度
 - E. 55%，深Ⅱ度
5. 伤后 48~72 小时内护理重点是（ ）。
 - A. 使用止痛剂
 - B. 输液抗休克
 - C. 注射破伤风抗毒素
 - D. 静脉使用抗生素
 - E. 清创
6. 伤后第一个 24 小时应补充晶体和胶体溶液的总量为（ ）。
 - A. 3500ml
 - B. 4500ml
 - C. 5250ml
 - D. 6500ml
 - E. 7250ml

【共用题干（7~9 题）】

某男性，下肢被汽车压伤后 4 天，尿量 24 小时<100ml，伴有恶心、呕吐、嗜睡、昏迷、抽搐等症状。化验血肌酐 460μmol/L，尿素氮 26mmol/L。

7. 根据病情，该病人的护理评估为（ ）。
 - A. 急性呼吸衰竭
 - B. 弥漫性血管内凝血
 - C. 急性肾衰竭少尿期
 - D. 急性肾衰竭无尿期

- E. 急性肾衰竭恢复期

8. 该病人的护理诊断不包括（ ）。

- A. 体液过多
- B. 并发高血钾
- C. 并发尿毒症
- D. 并发高血钙
- E. 并发代谢性酸中毒

9. 该病人的护理措施中效果最可靠的是

- （ ）。
- A. 限制入水量
- B. 纠正电解质和酸碱平衡紊乱
- C. 预防感染
- D. 多进饮食
- E. 透析疗法

【共用题干（10~12 题）】

女性，24 岁，右前臂外伤 2 小时，伤口深而窄，污染较重，准备清创缝合。

10. 清创缝合的目的不包括（ ）。
 - A. 使伤口转变为清洁伤口
 - B. 免去使用抗生素
 - C. 预防破伤风
 - D. 清除异物和坏死组织
 - E. 争取一期愈合
11. 不可用来冲洗伤口的是（ ）。
 - A. 70%乙醇
 - B. 0.9%氯化钠
 - C. 3%过氧化氢
 - D. 0.02%高锰酸钾
 - E. 0.5%PVP-碘
12. 以下绷带包扎方法适用于该病人的是（ ）。
 - A. 环形
 - B. 蛇形
 - C. 螺旋形
 - D. 螺旋反折形
 - E. 8 字形

【共用题干（13~14 题）】

男，28 岁，被沸水烫伤，左上肢，颈部，胸腹部，双足和双小腿均有水疱，有剧痛；

右手掌焦痂呈皮革样，不痛；面部红斑，表面干燥，并发低血容量性休克。

13. 估计该病人Ⅱ度烧伤面积为()。

- A. 54%
- B. 49%
- C. 58%
- D. 45%
- E. 39%

14. 输液护理中，判断血容量已补足的简便、可靠的依据是()。

- A. 脉搏在 120 次/分以下
- B. 收缩压在 12kPa 以上
- C. 中心静脉压在 6cmH₂O 以上
- D. 安静，肢端温暖
- E. 尿量每小时 30ml 以上

【共用题干(15~17题)】

女，23岁，左小腿挫裂伤一周，创面约 15cm×3cm，有较多坏死组织与脓液，需换药。

15. 上述创面应选用()湿敷。

- A. 优锁溶液
- B. 5%氯化钠
- C. 0.1%雷佛奴尔
- D. 0.02%呋喃西林
- E. 3%过氧化钠

16. 给此病人换药，下列操作错误的是()。

- A. 外层敷料可用手揭除
- B. 内层敷料用镊子揭去
- C. 双镊操作，一把接触伤口
- D. 盐水棉球拭去伤口内脓液
- E. 粘贴胶布与肢体纵轴平行

17. 用卷轴带给该病人固定敷料，包扎方法应选用()。

- A. 环行
- B. 蛇形
- C. 螺旋反折形
- D. 8字形
- E. 回返形

【共用题干(18~20题)】

男性，19岁，车祸致伤，即来院急诊，神志朦胧，咯血，口鼻均有泥砂夹血外溢，呼吸困难，烦躁不安。左胸侧严重擦伤，肿胀，心率 98 次/分，血压 16/12kPa (120/90mmHg)，四肢活动尚可，左大腿中下段中度肿胀，有瘀斑和严重擦伤。

18. 此时最紧迫的抢救措施是()。

- A. 请胸外科医师会诊处理
- B. 清除上呼吸道异物，保持呼吸道通畅
- C. 输血
- D. 吸氧
- E. 左下肢夹板固定

19. 下列诊断可不予以考虑的是()。

- A. 颅脑损伤
- B. 鼻骨骨折
- C. 肋骨骨折
- D. 左股骨骨折
- E. 血气胸

20. 下列处理中不必紧急做的是()。

- A. 吸氧
- B. 颅脑与胸部、左股骨 X 线摄片
- C. 多科会诊处理
- D. 左下肢包扎固定
- E. 输血

【共用题干(21~23题)】

成人，体重 60kg，烧伤，于下午 4 时送入医院急诊室，检查：意识清，能合作，心率 100 次/分，血压 16.0/11.2kPa (120/84mmHg)，面部、胸部、腹部、两前臂、两手及两小腿和足部Ⅱ、Ⅲ度烧伤，下午 5 时开始静脉输液，6 时入手术室，清创，晚上 8 时送病房。

21. 烧伤总面积为()。

- A. 47%
- B. 48%
- C. 49%
- D. 50%
- E. 51%

22. 输液计划起算时间为()。

- A. 下午 2 时
- B. 下午 4 时
- C. 下午 5 时
- D. 下午 6 时
- E. 下午 8 时

23. 烧伤后第一个 24h 应补给胶体、晶体液计算量为 ()。

- A. 5600ml
- B. 6200ml
- C. 6800ml
- D. 5400ml
- E. 6000ml

【共用题干 (24~27 题)】

患儿, 6 岁, 体重 20 kg, 在家玩耍时不慎打翻开水瓶, 双下肢被开水烫伤后皮肤出现大水疱, 皮薄, 疼痛明显, 水疱破裂后创面为红色。

24. 此患儿的烧伤深度为 ()。

- A. I 度
- B. 浅 II 度
- C. 深 II 度
- D. III 度
- E. IV 度

25. 该患儿的烧伤面积为 ()。

- A. 20%
- B. 40%
- C. 46%
- D. 50%
- E. 70%

26. 该患儿烧伤后第一个 24 小时应补的晶体和胶体液量为 ()。

- A. 1040ml
- B. 1140ml
- C. 1240ml
- D. 1340ml
- E. 1440ml

27. 对于该患儿的现场处理不正确的是 ()。

- A. 大量补液

- B. 迅速送往医院
- C. 创面涂抹龙胆紫
- D. 迅速脱离热源
- E. 用自来水大量冲洗双下肢

【共用题干 (28~32 题)】

男, 25 岁, 不慎被开水烫伤左上肢、躯干部 (除会阴部) 及双臀部等。

28. 患者烧伤面积是 ()。

- A. 9%
- B. 18%
- C. 27%
- D. 40%
- E. 46%

29. 患者诉伤口疼痛, 烧伤部位水泡破裂后, 基底潮湿, 均匀发红, 其深度应是 ()。

- A. I 度
- B. 浅 II 度
- C. II 深度
- D. III 度
- E. 混合深度

30. 患者体重为 50kg, 伤后第一个 24h 补液量应是 ()。

- A. 2000ml
- B. 3000ml
- C. 4000ml
- D. 5000ml
- E. 6000ml

31. 患者在输液中监测尿量为 20ml/h, 正确的处理是 ()。

- A. 维持原速
- B. 加快输液
- C. 减慢输液
- D. 加用甘露醇
- E. 用强心甙

32. 患者体温升高 39℃, 伴寒战, 血白细胞升高, 创面恶化, 提示有败血症征象, 以下措施主要应由护士完成的是 ()。

- A. 使用有效抗生素
- B. 正确处理创面

- C. 支持疗法
- D. 纠正酸中毒
- E. 消毒隔离

A2 型题

病例：男性病人，26岁。右膝外侧皮肤挫裂伤4小时。创面1.5cm×3cm，伤口内有沙土污染。

1. 目前处理原则主要是（ ）。
- A. 清创缝合+TAT
 - B. 清创不缝合+TAT
 - C. 换药+抗生素

- D. 清创缝合+引流
- E. TAT+抗生素

B 型题

- A. 清创后不予缝合
- B. 清创后一期缝合
- C. 清创后延期缝合
- D. 清创后植皮
- E. 按感染伤口处理

1. 火器伤2小时后，处理应（ ）。
2. 膝关节开放性创伤24小时后，无明显感染征象，处理应（ ）。

第九章 移植

A1 题型

1. 以下移植方法存活率最高的是（ ）。
 - A. 自体移植
 - B. 同质移植
 - C. 充分配血及组织配型后移植
 - D. 同种异体移植
 - E. 异种异体移植
2. 游离植皮术后护理中的重点是（ ）。
 - A. 植皮区多层敷料加压包扎
 - B. 局部抬高以利静脉回流
 - C. 可在术后 1 周换药
 - D. 绷带包扎压力均匀
 - E. 植皮区肢体制动
3. 下列属于细胞移植的是（ ）。
 - A. 植皮
 - B. 肾移植
 - C. 输血
 - D. 肝脏移植
 - E. 植骨
4. 不属于同基因移植的是（ ）。
 - A. 异体皮移植
 - B. 同卵双生异体移植
 - C. 自体皮肤移植
 - D. 自体输血
 - E. 自体骨移植
5. 急性排异反应出现在移植后（ ）。
 - A. 24 小时内
 - B. 1~2 周内
 - C. 1~2 个月内
 - D. 1~2 年内
 - E. 2~3 天内
6. 植皮术后护理,下列错误的是()。
 - A. 保持包扎部位的清洁、干燥
 - B. 病人不可手抓受皮区
 - C. 抬高患部
 - D. 皮片有积血、积脓应剪开小口引流
 - E. 植皮的肢体要加强活动
7. 大面积烧伤病人Ⅲ度创面,切痂后以小猪皮移植是属于()。
 - A. 自体移植
 - B. 同质移植
 - C. 同质异体移植
 - D. 异种异体移植
 - E. 吻合移植
8. 关于断肢再植术后护理,以下不正确的是()。
 - A. 室温在 24℃左右
 - B. 将移植肢体置于稍高于心脏水平
 - C. 静点低分子右旋酐
 - D. 静点升压药
 - E. 应用抗生素抗感染
9. 断指再植术后第 1 日,发现再植的断指肿胀明显,呈暗红色,其原因是()。
 - A. 动脉栓塞
 - B. 静脉栓塞
 - C. 断端创面内血肿
 - D. 淋巴回流障碍
 - E. 组织坏死感染
10. 同卵双生兄弟组织互相移植,属于()。
 - A. 自体移植
 - B. 同质移植
 - C. 同种异体移植
 - D. 异种异体移植
 - E. 再植
11. 关于断离肢体的保护方法,以下正确的是()。

- A. 浸泡在 2℃~4℃的冰水中
 - B. 无菌敷料包扎后置入冰块容器
 - C. 无菌包扎后置入塑料袋封口后干冰冷藏
 - D. 无菌包扎后置入冰冻生理盐水容器
 - E. 结扎出血点, 无菌敷料包扎冷藏
12. 关于断肢再植术后护理, 以下不正确的是 ()。
- A. 注意有无休克及肾衰竭
 - B. 使用扩血管及疏通微循环药物
 - C. 患肢抬高超过心脏平面 25cm
 - D. 避免寒冷, 以防血管痉挛
 - E. 肢体水肿可做顺向按摩
13. 供移植器官的保存原则是 ()。
- A. 常温保
 - B. 低温原则
 - C. 延长热缺血时间
 - D. 变冷缺血为热缺血
 - E. 中断血流后不应立即降温
14. 超急排斥反应发生在 ()
- A. 术后 3 天内
 - B. 术后一个月内

- C. 术后 24 小时
- D. 术后 12 天内
- E. 术后 12 周内

A2 题型

1. 男性, 47 岁, 因右小腿被机器齿轮碾压 6 小时来诊。体检: 面色苍白, BP 8/6kPa, 脉搏细弱, 右小腿下 1/3 截断, 远断残存尚完整。正确的处理方法是 ()。
- A. 立即行断肢再植术
 - B. 立即输血纠正休克
 - C. 输血的同时行清创截肢术
 - D. 纠正休克后行再断肢植术
 - E. 纠正休克后行残肢包埋缝合
2. 事故现场有一前臂断离病人, 尚有几厘米皮肤相连, 正确的急救措施是 ()。
- A. 无菌敷料包扎, 抗休克转送
 - B. 托扶断肢急速转送
 - C. 抗休克, 将断肢浸入冰水
 - D. 切下断肢无菌包裹, 干冰冷藏
 - E. 保护相连皮肤, 无菌包裹, 抗休克转送

第十章 肿瘤

A1 题型

1. 有关肿瘤的叙述不对的是 ()。
 - A. 来自间叶组织的恶性肿瘤称肉瘤
 - B. 良性肿瘤不发生转移
 - C. 区域淋巴结未发现癌细胞,说明无远处转移
 - D. 肿块是肿瘤最常见的局部表现
 - E. 恶性肿瘤的细胞分化程度较低
2. 良性肿瘤不具备的性质是 ()。
 - A. 生长速度较慢
 - B. 多有完整包膜
 - C. 多呈浸润性生长
 - D. 无转移
 - E. 一般不危及病人生命
3. 以下不是恶性肿瘤的晚期表现的是 ()。
 - A. 消瘦
 - B. 乏力
 - C. 食欲亢进
 - D. 贫血
 - E. 发热
4. 肿瘤病人体外放射治疗过程中出现三度皮肤反应,其表现为 ()。
 - A. 红斑、刺痒
 - B. 水肿、水疱
 - C. 高度出血水肿
 - D. 溃疡或坏死
 - E. 糜烂、渗出
5. 因消化道恶性肿瘤转移最早受累的是 ()。
 - A. 肺
 - B. 肾
 - C. 肝
 - D. 脾
 - E. 胰
6. 恶性肿瘤早期常有 ()。
 - A. 消瘦
 - B. 无力
 - C. 食欲不振
 - D. 贫血
 - E. 以上都对
7. 鉴别良、恶性肿瘤主要依据是 ()。
 - A. 内镜检查
 - B. 同位素检查
 - C. 超声波检查
 - D. 免疫学检查
 - E. 细胞学检查
8. 癌瘤广泛骨转移时可出现 ()。
 - A. 血钙升高
 - B. 血钙降低
 - C. 血镁升高
 - D. 血镁降低
 - E. 血磷升高
9. 有关癌症肿块的特征,不正确的是 ()。
 - A. 表面高低不平
 - B. 边界不清
 - C. 早期出现疼痛
 - D. 质地坚硬
 - E. 固定、不活动
10. 以下除 () 外,均是肿瘤的局部表现。
 - A. 肿块
 - B. 出血
 - C. 梗阻
 - D. 溃疡
 - E. 恶病质

11. 对良性肿瘤特点的表述, 正确的是 ()。
 - A. 不发生转移
 - B. 永不威胁生命
 - C. 细胞分化程度低
 - D. 均不需做任何处理
 - E. 多呈无规律的持续增长
12. 恶性肿瘤的临床特点是 ()。
 - A. 无转移
 - B. 危害较小
 - C. 边界清楚
 - D. 细胞分化低
 - E. 膨胀性生长
13. 当前对于多数肿瘤早期, 最好的治疗方法是 ()。
 - A. 手术疗法
 - B. 放射疗法
 - C. 化学药物疗法
 - D. 中医中药疗法
 - E. 免疫疗法
14. 诊断肿瘤, 下列最有价值的是 ()。
 - A. 患者年龄
 - B. 肿瘤标记检查
 - C. 影像学检查
 - D. 病理学检查
 - E. 内窥镜检查
15. 肿瘤的定性检查方法是 ()。
 - A. 核磁共振
 - B. CT 扫描
 - C. B 型超声
 - D. 病理检查
 - E. 同位素检查
16. 诊断恶性肿瘤可定性的方法是 ()。
 - A. 化实验室检查
 - B. X 线检查
 - C. 超声检查
 - D. 放射性同位素
 - E. 病理检查
17. 无临床症状的早期肝癌, 做群众性普查, 可用 ()。
 - A. B 超
 - B. 碱性磷酸酶
 - C. 血清甲胎蛋白
 - D. 放射性同位素肝扫描
 - E. X 线
18. 良性骨肿瘤的 X 线表现为 ()。
 - A. 边界清楚
 - B. 有袖口征
 - C. 有骨膜反应
 - D. 多处发病
 - E. 有死骨出现
19. 恶性肿瘤的治疗原则是 ()。
 - A. 手术治疗
 - B. 化学疗法
 - C. 放射疗法
 - D. 免疫疗法
 - E. 局部与全身相结合的综合疗法
20. 有关肿瘤治疗的叙述不对的是 ()。
 - A. 较小良性肿瘤, 生长缓慢, 无症状者, 可暂不手术
 - B. 易恶变或生长较快, 出现症状者, 应尽早手术
 - C. 切除肿瘤是治疗恶性肿瘤最重要的方法
 - D. 姑息手术指不能切除病灶, 为改善生存质量而做的手术
 - E. 化疗可杀死肿瘤细胞, 也可杀死正常细胞
21. 对放射线高度敏感的肿瘤是 ()。
 - A. 鼻咽癌
 - B. 淋巴瘤
 - C. 宫颈癌
 - D. 乳癌
 - E. 肺癌
22. 化疗最严重的毒性反应是 ()。
 - A. 血栓性静脉炎
 - B. 口腔溃疡

- C. 肝损害
D. 骨髓抑制
E. 皮肤反应
23. 恶性肿瘤病人化疗期间, 白细胞降至 $3 \times 10^9/L$ ($3000/MI$), 处理首先应()。
- A. 加强营养
B. 减少用药量
C. 少量输血
D. 服生血药
E. 暂停用药
24. 恶性肿瘤化疗时应掌握的原则, 不包括()。
- A. 诊断必须明确
B. 有手术指征不可错过手术时机
C. 注意不良反应
D. 每周查白细胞
E. 白细胞在 $0.4 \times 10^9/L$ 以下时应用
25. 多数抗癌药物的副作用是()。
- A. 失眠
B. 低热
C. 黄疸
D. 少尿
E. 骨髓抑制
26. 肿瘤治疗措施不包括()。
- A. 手术治疗
B. 放射治疗
C. 抗生素类
D. 免疫治疗
E. 心理治疗
27. 对放射线中度敏感的肿瘤是()。
- A. 精原细胞癌
B. 胃癌
C. 肺癌
D. 食管癌
E. 淋巴瘤
28. 以下属于肿瘤特异性免疫疗法的是()。
- A. 接种卡介苗
B. 小棒状杆菌菌苗
C. 左旋咪唑
D. 异体瘤苗
E. 海藻酸钠
29. 抗肿瘤药物中, 以下属抗代谢类的是()。
- A. 环磷酰胺
B. 噻替哌
C. 5-氟脲嘧啶
D. 自力霉素
E. 长春新碱
30. 恶性肿瘤对放射疗法不敏感的有()。
- A. 胃腺癌
B. 鼻咽癌
C. 乳癌
D. 淋巴肉瘤
E. 前列腺癌
31. 一、二期乳癌主要治疗方法是()。
- A. 放射治疗
B. 化学治疗
C. 内分泌治疗
D. 手术治疗
E. 免疫治疗
32. 肿瘤化疗病人出现()反应, 就必须停药。
- A. 呕吐频繁
B. 白细胞计数 $< 3 \times 10^9/L$ ($3000/mm^3$)
C. 严重秃发
D. 血小板计数 $10 \times 10^9/L$ ($10 \text{ 万}/mm^3$)
E. 腹泻
33. 化疗药物静脉注射时有溢出, 下列处理应禁忌的是()。
- A. 立即停止给药
B. 及早热敷
C. 硫代硫酸钠局封
D. 普鲁卡因局部注射
E. 等渗盐水局部注射
34. 关于化疗病人的护理, 以下错误的是

是()。

- A. 每周查血象 1~2 次
- B. 低于 $3 \times 10^9/L$, 给生血药
- C. 限制进食以防呕吐
- D. 静脉用药应稀释到要求浓度
- E. 鼓励病人多饮水

35. 晚期恶性骨肿瘤的护理是()。

- A. 减轻痛苦
- B. 加强功能锻炼
- C. 绝对卧床
- D. 限制饮食
- E. 预防褥疮

36. 放疗引起局部皮肤红斑、灼痛时, 错误的护理措施是()。

- A. 保持清洁干燥
- B. 避免内衣摩擦
- C. 不宜日光直射
- D. 禁止热敷、冷敷
- E. 局部外涂碘酊

37. 关于肿瘤化疗护理, 以下不正确的是()。

- A. 药液必须新鲜配制
- B. 静脉注射不可溢出静脉外
- C. 用过的注射器和空药瓶立即放入水中
- D. 如有治疗药物溢出静脉, 应立即热敷
- E. 每周检查一次血白细胞和血小板计数

38. 对放疗、化疗的肿瘤病人查血象的时间是()。

- A. 每月 1~2 次
- B. 每周 1~2 次
- C. 每天 1 次
- D. 每天 2 次
- E. 每半个月 1~2 次

39. 肿瘤的护理诊断不包括()。

- A. 焦虑与恐惧
- B. 营养失调

C. 休克

D. 潜在并发症

E. 组织完整性受损

40. 关于放疗病人的护理, 以下错误的是()。

- A. 照射野通过口腔时, 应先治疗龋齿
- B. 每次照射后安置病人静卧半小时
- C. 鼓励高营养饮食及多饮水
- D. 照射部位应保持清洁, 经常用肥皂水清洗
- E. 告知病人穿宽松柔软、吸湿性强的内衣

41. 肿瘤病人化疗或放疗期间, 最主要的观察项目是()。

- A. 脱发程度
- B. 食欲不振
- C. 恶心呕吐
- D. 皮肤损害
- E. 血白细胞和血小板计数

42. 关于皮脂腺囊肿, 正确的是()。

- A. 简称皮样囊肿
- B. 与表面皮肤紧密相连, 呈分叶状
- C. 是皮脂腺排出管阻塞所致
- D. 与深层组织相连, 活动性大
- E. 易发生恶变

A2 题型

1. 某女士, 恶性肿瘤住院化疗, 护理不对的是()。

- A. 病室应安静、舒适
- B. 室温应保持在 15°C 左右
- C. 定期消毒病室
- D. 严格控制探视
- E. 适当户外活动

2. 某患者, 胃癌根治术后 2 个月, 行放疗期间出现皮肤反应, 照射部位最初表现为皮肤红斑、瘙痒, 继而又出现水肿、水疱, 正确的处理是()。

- A. 照射部位用肥皂水清洗, 以保持局部清洁, 防止感染
 - B. 照射部位可涂搽油膏、乳剂和水剂, 以保持局部湿润
 - C. 皮肤有脱屑时, 应揭下来
 - D. 干反应可涂 0.2% 薄荷淀粉或羊毛脂止痒
 - E. 湿反应可涂 2% 甲紫或氢化可的松霜, 并进行包扎
3. 王小姐, 胃癌术后化疗, 病人恶心、呕吐、消瘦、纳差, Hb 98.0g/L, 血清总蛋白 53g/L, 护理诊断是 ()。
- A. 呕吐
 - B. 恶心
 - C. 低蛋白血症
 - D. 食欲不振
 - E. 营养不良
4. 某护士为一淋巴瘤的患者静脉注射氮芥, 患者感局部明显疼痛, 肿胀, 回抽无回血, 立即拔出针头, 但局部仍痛, 下列处理正确的是 ()。
- A. 给止痛药
 - B. 以热水袋热敷
 - C. 以 50% 硫酸镁湿热敷
 - D. 外敷止痛膏
 - E. 局部冷敷, 以稀硫代硫酸钠局部封闭
5. 艾先生, 59 岁, 食管癌行放疗, 查白细胞 $2.95 \times 10^9/L$, 食欲不振, 消瘦。错误的措施是 ()。
- A. 暂停放疗
 - B. 给予生血药
 - C. 遵医嘱输入新鲜血液
 - D. 其妻子患上呼吸道感染为安慰病人应劝其探视
 - E. 遵医嘱使用抗生素

A3 题型

【共用题干 (1~3 题)】

女性, 45 岁, 肝癌切除术后 2 周, 准备进行静脉化疗。

1. 以下评估内容, 对化疗无重要意义的是 ()。
- A. 红细胞沉降率
 - B. 肝功能
 - C. 肾功能
 - D. 血常规
 - E. 消化道功能
2. 化疗病人最严重的毒性反应是 ()。
- A. 恶心
 - B. 骨髓抑制
 - C. 呕吐
 - D. 腹泻
 - E. 脱发
3. 化疗过程中病人可存在的护理诊断是 ()。
- A. 潜在并发症: 血栓性静脉炎
 - B. 有感染的危险
 - C. 潜在并发症: 肝肾功能损害
 - D. 潜在并发症: 骨髓抑制
 - E. 清理呼吸道无效

【共用题干 (4~5 题)】

慢性肝病患者, 普查发现甲胎蛋白 3 次阳性, 肝功能正常, 肝区触诊无异常, 诊断为早期肝癌

4. 下列检查对定位最有帮助的是 ()。
- A. 选择性肝动脉造影
 - B. 放射性核素扫描
 - C. 超声波扫描
 - D. X 线断层扫描
 - E. 以上都不是
5. 理想的治疗方法是 ()。
- A. 力争手术切除
 - B. 局部外照射
 - C. 联合化疗
 - D. 免疫疗法
 - E. 中医疗法

【共用题干 (6~7 题)】

女性，52岁，发现右乳外上象限肿块3月，约3cm×2.5cm大小，同侧腋窝触及肿大、质硬淋巴结，全身情况良好。

6. 为确诊肿块性质最好采用（ ）。

- A. 红外线摄影
- B. 钼靶X线摄影
- C. 穿刺活检
- D. 切除活检

E. 切取活检

7. 如确诊为乳癌，较理想的治疗方案为（ ）。

- A. 乳癌根治术
- B. 乳癌根治术加放射治疗
- C. 乳癌根治术加免疫治疗
- D. 乳癌根治术加中医治疗
- E. 乳癌根治术加内分泌治疗

第十一章 心肺复苏

A1 题型

1. 复苏处理要分秒必争，主要目的是（ ）。
 - A. 迅速恢复脑的血液循环
 - B. 使心脏迅速恢复跳动
 - C. 使自主呼吸提早恢复
 - D. 减轻酸中毒
 - E. 保护肾功能
2. 心跳呼吸骤停患者造成呼吸梗阻的最主要原因是（ ）。
 - A. 咽部异物
 - B. 气管内痰液
 - C. 舌根后坠
 - D. 口内异物
 - E. 以上都是
3. 心肺复苏后，最易出现是继发性病理改变的是（ ）。
 - A. 心肌损伤
 - B. 肺水肿
 - C. 脑水肿
 - D. 肝坏死
 - E. 肾功能衰竭
4. 心跳停止时间是指从循环停止到（ ）。
 - A. 意识恢复
 - B. 自主呼吸恢复
 - C. 心脏自动节律恢复
 - D. 重建有效人工循环
 - E. 呼吸心跳恢复正常
5. 脑复苏时，为防止脑组织发生不可逆损伤，脑循环血量最低应保持在（ ）。
 - A. 25%
 - B. 20%
 - C. 15%
 - D. 10%
 - E. 5%
6. 为迅速判断病人心跳骤停，首先应（ ）。
 - A. 听心音
 - B. 测血压
 - C. 看面色
 - D. 触颈、股动脉有无搏动
 - E. 做心电图
7. 诊断心搏骤停最迅速可靠的指标是（ ）。
 - A. 大动脉搏动消失
 - B. 呼吸停止
 - C. 瞳孔放大
 - D. 血压测不到
 - E. 脉搏摸不清
8. 在意外事故现场，对受难者诊断心跳是否停止，最迅速有效的方法是（ ）。
 - A. 听心音
 - B. 观察心尖搏动
 - C. 测血压
 - D. 作心电图
 - E. 摸颈动脉搏动
9. 对一昏迷者判断其心跳是否停止最迅速有效的指标是（ ）。
 - A. 呼吸停止
 - B. 血压下降
 - C. 瞳孔散大
 - D. 无大动脉搏动
 - E. 呼之不应
10. 溺水者救出水面后应立即（ ）。
 - A. 测血压
 - B. 吸氧

- C. 清理呼吸道, 保持其通畅
D. 呼叫 120
E. 测脉搏
11. 病人心肺复苏后, 脑复苏的主要措施是 ()。
- A. 维持有效的循环
B. 确保呼吸道通畅
C. 降温和脱水疗法
D. 加强基础护理
E. 治疗原发疾病
12. 复苏时一人行胸外心脏按压和人工呼吸的次数比例是 ()。
- A. 30:2
B. 5:1
C. 15:1
D. 5:2
E. 以上均不对
13. 现场心肺复苏操作首要步骤是 ()。
- A. 心前区扣击
B. 心脏按压
C. 口对口人工呼吸
D. 按额托项, 保持呼吸道通畅
E. 心内注射
14. 胸外心脏按压, 手掌跟部应按于 ()。
- A. 胸骨上部
B. 胸骨中部
C. 胸骨中下 1/3 处
D. 心前区
E. 剑突部
15. 心肺复苏时一般选用的药物是 ()。
- A. 利多卡因
B. 去甲肾上腺素
C. 阿托品
D. 肾上腺素
E. 异丙肾上腺素
16. 下列常用的复苏药中首选药物是 ()。
- A. 肾上腺素
B. 利多卡因
C. 阿托品
D. 氯化钙
E. 碳酸氢钠
17. 治疗心跳骤停后所造成的缺氧性脑损伤常用的基本方法是 ()。
- A. 头部降温
B. 脱水疗法
C. 应用大量糖皮质激素
D. 给予能量合剂
E. 以上都是
18. 脑复苏低温疗法的护理, 错误的是 ()。
- A. 头部降温是重点
B. 尽早采取降温措施
C. 先须控制寒战
D. 体温应低于 32℃, 2 天后复温
E. 控制每日输液量
19. 心跳骤停抢救时, 错误的是 ()。
- A. 病人背部垫木板
B. 迅速进行有效人工呼吸
C. 胸外按压胸骨下陷 2cm
D. 胸外按压频率 60~80 次/分
E. 心内注射心脏复苏药物
20. 有关胸外心脏按压, 错误的是 ()。
- A. 平卧, 背部垫硬板
B. 在心尖区按压
C. 按压次数 70~80 次/分钟
D. 按压时双肘伸直
E. 按压时使胸骨下陷 4cm
21. 复苏成功的标志, 以下不符的是 ()。
- A. 大动脉出现搏动
B. 收缩压在 80mmHg 以上
C. 瞳孔由大缩小
D. 紫绀减轻
E. 自主呼吸恢复
22. 两人进行心肺复苏, 一人做人工呼

- 吸，一人做心脏按压，其比例是（ ）。
- 4次心脏挤压，1次人工呼吸
 - 5次心脏挤压，1次人工呼吸
 - 8次心脏挤压，1次人工呼吸
 - 10次心脏挤压，1次人工呼吸
 - 30次心脏挤压，2次人工呼吸
23. 施行口对口人工呼吸时，操作者深吸后用力吹气时，吹出气中氧浓度是（ ）。
- 5%
 - 10%
 - 15%
 - 16%~18%
 - 20%
24. 防治室性早搏或阵发性心动过速的首选药物是（ ）。
- 利多卡因
 - 碳酸氢钠
 - 阿托品
 - 氯化钙
 - 溴苄胺
25. 成人胸外心脏除颤采用（ ）。
- 5~50 瓦秒电能
 - 20~80 瓦秒电能
 - 200 瓦秒电能
 - 2 瓦秒/千克
 - 500 瓦秒电能
26. 治疗高血钾引起的心跳停止的是（ ）。
- 阿托品
 - 肾上腺素
 - 溴苄胺
 - 氯化钙
 - 氯化钾
27. 为成人施行胸外按压时，应使胸骨下陷（ ）。
- 1~2cm
 - 2~3cm
 - 4~5cm
 - 6~8cm
 - 8~10cm
28. 胸外除颤的两个电极位置分别是（ ）。
- 心尖部、胸骨右缘第1肋间
 - 心尖部、胸骨右缘第2肋间
 - 剑突、胸骨右缘第1肋间
 - 剑突、胸骨右缘第2肋间
 - 心尖部、胸骨角
29. 心肺复苏时抗心律失常的首选药物是（ ）。
- 肾上腺素
 - 利多卡因
 - 阿托品
 - 多巴胺
 - 碳酸氢钠
30. 心肺复苏首选的给药途径是（ ）。
- 皮下
 - 舌下
 - 动脉
 - 静脉
 - 心内
31. 下列操作中初期复苏的首要关键是（ ）。
- 心脏挤压
 - 口对口人工呼吸
 - 保持呼吸道通畅
 - 简易人工呼吸器使用
 - 电除颤
32. 临床死亡期是在心跳骤停后的（ ）。
- 2 分钟内
 - 5 分钟内
 - 8 分钟内
 - 10 分钟内
 - 15 分钟内
33. 胸外电除颤成人一次所需的电能为（ ）。
- 10J
 - 10~30J
 - 50J

- D. 100~300J
E. 500J
34. 胸外心脏按压有效的标志不包括()。
- 摸到颈动脉和股动脉搏动
 - 口唇发绀逐渐减轻
 - 收缩压在 80mmHg 以上
 - 散大的瞳孔开始缩小
 - 自主呼吸恢复
35. 以下有关胸外心脏按压操作, 不对的是()。
- 按压锁骨中线第 5 肋间心尖区
 - 按压次数 60~80 次/分
 - 按压力度使胸骨下陷 4cm
 - 背部垫硬板
 - 与人工呼吸配合次数为 30:2
36. 口对口人工呼吸操作, 下列不对的是()。
- 先保持呼吸道通畅
 - 右手控闭鼻孔
 - 左手托下颌
 - 吹气时间占 2/3, 呼出时间占 1/3
 - 每分钟 16~20 次/分
37. 脑复苏措施中, 最佳的脱水剂是()。
- 速尿
 - 山梨醇
 - 甘露醇
 - 50%葡萄糖液
 - 尿素
- A2 题型**
1. 严先生, 29 岁, 装修房屋违章操作, 触电, 电线一端与其有接触, 错误的处理是()。
- 迅速关闭电源
 - 拔掉插座
 - 用干燥的竹竿拉开触电人身上的电线
 - 用干燥的木棍拉开触电人身上的电线
 - 用两只手去拉触电人的干燥衣服, 使之脱离电源
2. 潭先生, 因触电致心跳、呼吸骤停, 胸外心脏按压操作不正确的是()。
- 按压部位在胸骨下段
 - 双手相叠挤压
 - 每次按压胸骨下陷 4cm
 - 每分钟 60~80 次
 - 与人工呼吸配合的比率为 2:1
3. 一个电工在带电进行线路检查时, 突然大叫一声, 摔倒在地, 无任何反应, 判定病人呼吸心跳停止的是()。
- 无自主呼吸
 - 神志消失
 - 大动脉无搏动
 - 去医院心电图检查
 - 听诊心音
4. 一病人在硬膜外麻醉下行胆囊切除术, 胸 7~8 穿刺, 首次给 1.33%利多卡因 30ml, 给药后 20 分钟医生划刀时发现血色发紫, 刀口不渗血, 诊断心跳停止, 应进行的抢救措施是()。
- 头部降温
 - 脱水治疗
 - 胸内心脏按压
 - 气管插管及胸外心脏按压
 - 口对口人工呼吸
5. 一名冠心病病人在全麻下行左肺切除术, 术中处理肺门时突然心室颤动, 正确的判定方法()。
- 胸外心脏按压
 - 胸外电除颤
 - 胸内心脏按压
 - 静注利多卡因 1mg/kg
 - 胸内电除颤
6. 一名溺水游客被救出水后, 神志不清, 呼吸停止, 口唇发绀, 需口对口人工呼吸的

先决条件是（ ）。

- A. 清除口腔分泌物，保持呼吸道通畅
- B. 病人置于仰卧位
- C. 每次吹入 800ml 气体
- D. 确定呼吸停止
- E. 每分钟吹气 16 次

7. 患者男性，46 岁，因车祸致伤，现场急救时发现心跳呼吸已停止约 6 分钟，胸

部严重创伤，两侧均有多根多处骨折，复苏时应采取（ ）。

- A. 胸外心脏按压
- B. 口对口人工呼吸
- C. 胸内心脏按压
- D. 心内注射肾上腺素
- E. 心脏起搏器

第十二章 急性肾功能衰竭

A1 题型

1. 急性肾功能衰竭少尿期电解质紊乱错误的是 ()。

- A. 高磷
- B. 低钾
- C. 高镁
- D. 低钠
- E. 低钙

2. 急性肾功能衰竭少尿期主要死亡原因是 ()。

- A. 低钠血症
- B. 高钾血症
- C. 氮质血症
- D. 代谢性酸中毒
- E. 水中毒

3. ARF 的实验室诊断依据, 错误的是 ()。

- A. 尿比重固定在 1.010~1.014
- B. 镜下见大量红细胞、肾小管上皮细胞
- C. 血钾呈直线上升
- D. 尿钠常超过 40 nmol/L
- E. 血中酚、胍等毒性物质增多

4. 关于多尿期的叙述正确的是 ()。

- A. 每日尿量超过正常人的尿量, 即示进入多尿期
- B. 在初期, 少尿期的症状仍可继续加重
- C. 进入多尿期表示病情已经好转
- D. 高钾和感染常是此期死亡的原因
- E. 多尿期的结束, 表示肾功能已恢复正常

5. 病人肾衰竭后, 血肌酐、尿素氮迅速

升高, 出现恶心、呕吐、头痛、烦躁、乏力、昏迷、抽搐等症状。该患者已出现 ()。

- A. 水中毒
- B. 高血钾
- C. 酸中毒
- D. 尿毒症
- E. 低血钙

6. 急性肾功能衰竭患者电解质失调, 危害最严重的是 ()。

- A. 低血钠
- B. 高血钾
- C. 低血钙
- D. 高血磷
- E. 高血镁

7. 肾衰多尿期症状不对的是 ()。

- A. 低血钾
- B. 低血钠
- C. 血中非蛋白氮减少
- D. 脱水
- E. 氮质血症

8. 做 KUB 检查前 2~3 天应禁忌的药物是 ()。

- A. 抗生素
- B. 碘剂
- C. 铁剂
- D. 铋剂
- E. 钙剂

9. 急性肾功能衰竭少尿期日补液量应等于 ()。

- A. 尿量
- B. 显性失水量
- C. 显性失水量 + 不显性失水量 + 内生水
- D. 显性失水量 + 不显性失水量 - 内

- 生水
- E. 显性失水量+不显性失水量
10. 计算补液量时下列情况中应将内生水(代谢水)计算在内的是()。
- 休克早期
 - 急性肾衰
 - 肠梗阻
 - 大面积烧伤
 - 急性胆囊炎
11. 为预防急性肾功能衰竭,()的病人,应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液。
- 头皮撕脱伤
 - 肋骨骨折
 - 大腿挤压伤
 - 肾挫伤
 - 前臂裂伤
12. 在下列情况下输液时,须将内生水计算在补液总量中的是()。
- 水电解质平衡紊乱
 - 急性肾功能衰竭
 - 大面积烧伤
 - 急性肠梗阻
 - 胃肠外营养
13. ARF时必须减量的抗生素是()。
- 青霉素
 - 氯霉素
 - 红霉素
 - 卡那霉素
 - 氨苄青霉素
14. ARF时对血钾升高应采取的措施,除了()外都正确。
- 严禁使用含钾药物
 - 限制含钾食物摄入
 - 处理坏死感染组织
 - 使用促进蛋白质合成药物
 - 减少能量补充
15. 下列无助于预防急性肾功能衰竭发生的是()。
- 对创伤患者应及时进行清创
 - 对失血患者应及时补充血容量
 - 合理使用能量合剂
 - 避免使用对肾有损害的药物
 - 要控制输液速度
16. ARF少尿或无尿期补液原则是()。
- 越少越好
 - 越多越好
 - 量出为入,宁少勿多
 - 量出为入,宁多勿少
 - 每日定量输入
17. 某急性肾衰病人,50岁,前一天尿量为300ml,呕吐15ml,补液量估计为()。
- 500ml
 - 600ml
 - 700ml
 - 900ml
 - 1000ml
18. 急性肾衰少尿期错误的是()。
- 高钾、高钠饮食
 - 热量供应以糖为主
 - 脂肪适量
 - 补充各种维生素
 - 禁食蛋白质
19. 肾衰早期护理,下列错误的是()。
- 严格限制水分
 - 多食蛋白质
 - 预防感染
 - 详细记录尿量
 - 每日查尿素氮和血清钾
20. 急性肾功能衰竭少尿期病人饮食补给原则是()。
- 高蛋白,高糖,高维生素
 - 低蛋白,高糖,高维生素
 - 高蛋白,低糖,高维生素
 - 低蛋白,低糖,高维生素
 - 高蛋白,高糖,低脂肪

21. 下列有关 ARF 多尿期的护理措施不妥的是 ()。

- A. 加强营养支持
- B. 纠正电解质紊乱
- C. 合理使用抗生素
- D. 纠正贫血
- E. 补液应出入量平衡

22. 腹膜透析护理下列错误的是 ()。

- A. 病人平卧位或侧卧位
- B. 严格执行无菌操作
- C. 透析液的温度为 37℃
- D. 保持透析导管通畅
- E. 维持引流管的虹吸状态

23. 急性肾衰病人少尿期饮食护理, 下列错误的是 ()。

- A. 限制饮水
- B. 低蛋白
- C. 富含维生素

D. 以糖为主

E. 多吃水果

24. 关于急性肾功能衰竭的护理, 下列错误的是 ()。

- A. 尿量 < 400ml/d, 提示肾衰可能
- B. 少尿期饮食应取低蛋白
- C. 避免使用含钾食物
- D. 进入多尿期表示病人已脱离危险
- E. 禁用对肾有毒性作用的药物

A2 题型

1. 患者女性, 55 岁。因急性肾衰竭出现少尿, 正确的护理措施是 ()。

- A. 口服补液盐
- B. 高蛋白饮食
- C. 补充含钾果汁
- D. 禁用库存血
- E. 大量补液增加尿量